



भा. कृ. अनु. प.- केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
ICAR-Central Institute for Cotton Research, Nagpur
 An ISO 9001:2015 Certified Organisation

పత్తి సాగు- ఏడవ వారపు సలహా, జూలై 23, 2026 నుండి 29 జూలై 2026 వరకు
నేల ఆరోగ్యం, పోషణ, అలాగే చీడపీడలు మరియు తెగుళ్ల నిర్వహణపై సూచనలు

అధిక పత్తి దిగుబడులు సమతుల్యమైన నేల పోషకాలు, నీటి నిర్వహణ మరియు ముందుచూపుతో కూడిన, పర్యవేక్షణ ఆధారిత తెగుళ్లు, వ్యాధుల నివారణపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సమగ్రమైన మరియు ఏకీకృత పంట నిర్వహణ ప్రణాళికను అమలు చేయడం ద్వారా పంట సరైన పెరుగుదలను, బలాన్ని పొందుతుంది, పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గుతాయి మరియు పంటను తీవ్రమైన తెగుళ్లు, వ్యాధుల నష్టం నుండి కాపాడుతుంది.

నేల ఆరోగ్యం మరియు పోషక యాజమాన్యం:

- **స్థూల పోషకాలను వాడటం:** పంట మార్పిడి, సీండ్రియ సవరణలు మరియు కవర్ క్రాప్స్ కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా, మరియు విత్తే ముందు చేసే నేల పరీక్ష ఆధారంగా హేతుబద్ధమైన రసాయన ఎరువులను ఉపయోగించడం ద్వారా నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచండి.
- **సూక్ష్మ పోషకాలను అందచేయుట:** అవసరమైనప్పుడు పిచికారీల ద్వారా ద్వితీయ మరియు సూక్ష్మపోషకాల లోపాలను (జింక్, బోరాన్, మాంగనీస్ మరియు మెగ్నీషియం వంటివి) ముందుగానే పరిష్కరించండి.

సమగ్ర తెగుళ్ల యాజమాన్యం

- **ముందు జాగ్రత్త చెరియలు:** మొక్కల ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు తెగుళ్ల ఉద్ధృతిని తగ్గించడానికి, సరైన క్షేత్ర పరిశుభ్రతతో పాటు విత్తన మరియు నేల చికిత్సలుగా జీవన పురుగుమందులు మరియు జీవన ఎరువులను వాడటం వంటి సమగ్ర సాగు పద్ధతుల ద్వారా నేల మరియు ఆకుల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధికారక జీవులను అదుపు చేయాలి.
- **ఆకులపై వ్యాపించే తెగుళ్లను అదుపు చేయడం:** గాలిలో అధిక తేమ ఉన్న ప్రాంతాలలో పొలాలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి, మరియు వ్యాధి వేగంగా అభివృద్ధి చెంది వ్యాప్తి చెందడానికి పర్యావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, సిఫార్సు చేయబడిన శిలీంధ్రనాశకాలను ఉద్ధృతిని బట్టి వాడాలి.

సమగ్ర పురుగుల యాజమాన్యం

- **క్షేత్ర పరిశీలన నిర్వహించండి:** కాయతొలుచు పురుగులతో పాటు, రసం పీల్చే పురుగులు (తామర, పేనుబంక, పచ్చ దోమ మరియు నల్లి) పర్యవేక్షించడానికి వారానికి ఒకసారి క్షేత్ర పరిశీలన చేయండి.
- **లింగాకర్షక బుట్టలు మరియు జీవ సంబంధిత పురుగుమందులను ఉపయోగించండి:** తల్లి రెక్కల పురుగుల ఉనికిని గమనించడానికి పొలం లో బుట్టలు పెట్టాలి, రెక్కల పురుగు గుడ్డు పెట్టి సమయాన్ని గమనించాలి మరియు సీండ్రియ, సహజ, లేదా మొక్కల ఆధారిత పురుగుమందులను వాడటానికి పంట మొదటి దశలోనే చూడాలి.
- **సహజ శత్రువులను సంరక్షించండి:** అన్ని రకాలా పురుగుమందులు బదులుగా ఎంపిక చేసిన పురుగుమందులను ఎంచుకోవడం ద్వారా అక్షంతల పురుగులు , లేస్వింగ్స్ మరియు బిగ్-బెడ్ బగ్స్ వంటి ప్రయోజనకరమైన కీటకాలను కాపాడండి.
- **రసాయన పురుగుమందులను మితంగా వాడటం:** లేబుల్పై సిఫార్సు చేయబడిన రసాయన పురుగుమందులను చివరి ప్రయత్నంగా మాత్రమే ఉపయోగించండి; పురుగులు ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయికు చేరినప్పుడు మాత్రమే వాటిని ఉపయోగించాలి.



भा. कृ. अनु. प.- केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
ICAR-Central Institute for Cotton Research, Nagpur
 An ISO 9001:2015 Certified Organisation

పత్తి సాగు- ఏడవ వారపు సలహా, జూలై 23, 2026 నుండి 29 జూలై 2026 వరకు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్		గత వారంలో అసలైన వర్షపాతం (mm)							వచ్చే వారంలో వర్షపాతం అంచనా (mm)				
		జూలై							జూలై				
		14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26
	గుంటూరు	0	0	0	0	9	0	1	1.9	1.9	0.2	0.7	1.1
	ప్రకాశం	0	0	0	0	0.9	0	0	0.4	0.2	0.4	0.7	1.3
వర్షపాతం మొత్తం మరియు రంగు		0.1 to 2.4 mm		2.5 to 15.5 mm		15.6 to 64.4 mm			64.5 to 115.5 mm		115.6 to 204.4		
వర్షపాత వర్గం		చాలా తక్కువ వర్షపాతం		తేలికపాటి వర్షపాతం		మోస్తరు వర్షపాతం			భారీ వర్షపాతం		అతి భారీ వర్షపాతం		
పంట పరిస్థితి: గుంటూరు షేరాంతం లో తగినంత వర్షపాతం నమోదు అయితే ప్రత్తి విత్తడం జరుగుతుంది కేవలం 5 నుండి 10 శాతం రైతులు ప్రత్తి విత్తడం జరిగింది. పొలాల్లో సాగుకు ముందస్తు దుక్కిలు మరియు పొలం శుభ్రం చేసే పనులు పూర్తయ్యాయి. నంద్యాలలోని చాలా షేరాంతాలలో, సాగు చేసిన పంటలు వాడిపోవడం మరియు తేమ లేమి (moisture stress) లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఈ పంట ప్రస్తుతం షేరాంతం దశ నుండి శాఖీయ పెరుగుదల దశలో (17-47 రోజుల వయస్సులో) ఉంది. కొన్ని షేరాంతాలలో రసం పీల్చే పురుగులు ఆర్థిక నష్ట పరిమితి (ETL) స్థాయిని దాటి కనిపించాయి. ఈ నివేదిక కాలంలో అంతర కృషి పనులు చేపట్టబడ్డాయి.													
సలహా: గుంటూరు లో రైతులు లోతు దుక్కిలు దున్నుకోవాలి, దానివలన కోశస్థ దశలో ఉండే గులాబీ రంగు పురుగు మరియు కలుపు మొక్కలను నివారించవచ్చు. పొలం లో దిబ్బ ఎరువు వేసుకోవాలి. తక్కువ కాల పరిమితిగల విత్తనాలను ఎంచుకోవాలి. నెల ద్వారా సంక్రమించే తెగుళ్లను అరికట్టడానికి విత్తనం వేసేటప్పుడు కిలో విత్తనానికి 3.5 గ్రా కార్పాక్సిన్ 37.5% + ట్రైరం 37.5% DS లేదా 100 కిలోల పశువుల ఎరువులో లేదా ప్లాక్స్పిరోడ్ (333 గ్రా/లి) @ 1.5ml/kg విత్తనానికి లేదా టెబ్‌రాకోనోజోలే 11.6% SL @ 1.5ml/kg విత్తనానికి విత్తనశుద్ధి చేస్తే విత్తనం ద్వారా సంక్రమించే రోగాలన్నీ అరికట్టవచ్చు. అజాత్‌బాక్టర్, పీసబ్ మరియు కేఎంబి @ 10ml కిలో విత్తనానికి, ట్రికోడెర్మా హరజనీయం 2.5 కిలో హెక్టార్ కు కలపాలి. 80-100 mm వర్షపాతం నమోదు అయినప్పుడు విత్తనము వేసుకోవడం ద్వారా విత్తనం మొలకెత్తుకుపోయే సమస్య తగ్గించవచ్చు. ప్రత్తి విత్తన 48 గంటలలోపు కలుపు నివారణకు పెండిమేథాలిన్ 38.7% CS ఎకరాకు 700ml మందును 200 లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి. విత్తన 30 రోజులలోపు ఎకరాకు 60 కిలోల భాస్పారమ్, 50 కిలోల నత్రజని (N) మరియు 20 కిలోల పొటాష్ (K2O) చొప్పున భూమిలో వేయాలి. నంద్యాలలో, 70-80 వర్షం పడి , నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు విత్తనాలు వేయాలని, మరియు తాత్కాలిక పొడి వాతావరణాన్ని తట్టుకోవడానికి లీటరు నీటికి 10 గ్రాముల చొప్పున యూరియాను పిచికారీ చేయాలి . రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు, ఎకరానికి 1 లీటరు చొప్పున (200 లీటర్ల నీటిలో) వేప నూనెను పిచికారీ చేయాలి. TSV వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించడానికి గట్లపై ఉన్న కలుపును తొలగించాలి. తేమ ఒత్తిడిని నియంత్రించడానికి, తదుపరి వర్షాలు పడే వరకు వారానికి రెండుసార్లు లీటరు నీటికి 20 గ్రాముల యూరియాను లేదా లీటరు నీటికి 10 గ్రాముల చొప్పున 13-0-45ను పిచికారీ చేయాలి.													



भा. कृ. अनु. प.- केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर
ICAR-Central Institute for Cotton Research, Nagpur
 An ISO 9001:2015 Certified Organisation

పత్తి సాగు- ఏడవ వారపు సలహా, జూలై 23, 2026 నుండి 29 జూలై 2026 వరకు

తెలంగాణ		గత వారంలో అసలైన వర్షపాతం (mm)							వచ్చే వారంలో వర్షపాతం అంచనా (mm)				
		జూలై							జూలై				
		14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26
	ఆదిలాబాద్	0	0	0	0	0	0	2	21	9.5	1.1	0.5	1.8
	వరంగల్	0	0	0	0	48	4	10	10	2.8	0.4	0.4	0.5
	ఖమ్మం	0	0	0	0	0	7	2	4.5	2.9	0.3	2.2	1.6
	కరీంనగర్	0	0	0	8.5	0.8	2	39	9.6	4.3	0.3	0.3	1
	మహబూబనగర్	0	0	6	3	0.8	2	32.2	1.6	1	0.5	0.4	0.6
వర్షపాతం మొత్తం మరియు రంగు		0.1 to 2.4 mm		2.5 to 15.5 mm		15.6 to 64.4 mm			64.5 to 115.5 mm		115.6 to 204.4		
వర్షపాత వర్గం		చాలా తక్కువ వర్షపాతం		తేలికపాటి వర్షపాతం		మోస్తరు వర్షపాతం			భారీ వర్షపాతం		అతి భారీ వర్షపాతం		
పంట పరిస్థితి: వరంగల్ పొరాంతం లో నెతయారయి చేసి విత్తనం వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రత్తి విత్తడం మొదలుపెట్టాలిసిఉంది ఆదిలాబాద్ లో, విత్తిన పంట ప్రస్తుతం 25 నుండి 30 రోజుల దశ పొరంధమిక శాఖీయ దశలో ఉంది. కలుపు నివారణ మరియు తేమ సంరక్షణ కోసం మొలక వచ్చిన తర్వాత కలుపు మందు పిచికారీ, N:P:K పై పాటు పిచికారీ చేయాలి మరియు అంతర కృషి పనులు చేపట్టాలి. 15 రోజుల పాటు వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల పంటలో తేమ కొరత కనిపించింది, అలాగే పురుగు ఉదృతి చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు గమనించబడింది.													
సలహా: వరంగల్ పొరాంతం రైతులు ప్రత్తి రెండు నుండి మూడు సమస్త్రాలకు పంట మార్పిడి చేయాలి. పొలం లో లోతు దుక్కులు చేయడంవలన మట్టిలో దాక్కున్నా పురుగు కోశం దశలు, తెగుళ్లు మరియు కలుపు విత్తనాలు నాశనమవుతాయి. పొలం లో పశువుల ఎరువు వేసినట్లు అయితే మొక్క ఎదుగుదల దృఢంగా ఉంటుంది. మధ్యకాలిక ప్రత్తి రకాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. నెల ద్వారా సంక్రమించే తెగుళ్లను అరికట్టడానికి విత్తనం వేసేటప్పుడు కిలో విత్తనానికి 3.5 గ్రా కార్బాక్సిన్ 37.5% + థైరం 37.5% DS లేదా 100 కిలోల పశువుల ఎరువులో లేదా ఫ్లూక్సపిరిడ్ (333 గ్రా/లి) @ 1.5ml/kg విత్తనానికి లేదా టెట్రాకోనోజోల్ 11.6% SL @ 1.5ml/kg విత్తనానికి విత్తనశుద్ధి చేస్తే విత్తనం ద్వారా సంక్రమించే రోగాలన్నీ అరికట్టవచ్చు. అజాతబాక్టర్, పీసబ్ మరియు కేఎంబి @ 10ml కిలో విత్తనానికి, ట్రైకోడెర్మా హరజనీయం 2.5 కిలో హెక్టార్ కు కలపాలి. 80 నుండి 100 mm వర్షపాతం నమోదులయితే ప్రత్తి విత్తనం వేసినట్లు అయితే మొలక బాగా అవకాశం ఉంటుంది. రకం లేక హైబ్రిడ్ నెల అనుకూలతను బట్టి ఎంచుకోవాలి. ప్రత్తి విత్తిన 48 గంటలలోపు కలుపు నివారణకు పెండిమెథాలిన్ 38.7% CS ఎకరాకు 700ml పిచికారీ చేసుకోవాలి. పొలం లో మరియు పొలం గట్ల మీద కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి మరియు వయ్యారి భామ మొక్కలు లేకుండా చూసుకోవాలి దీని వలన తామర పురుగుల ఉదృతి తగ్గుతుంది మరియు టాబాకో స్ట్రీక్ వైరస్ అదుపులో ఉంటుంది. ఆదిలాబాద్ లో, పత్తిలో గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కల కోసం మొలకలు వచ్చిన తర్వాత వాడే కలుపు సంహారక మందు క్విజలోఫాప్ ఇథ్రల్ @ 2 మి.లీ లేదా పేరోపాక్సిజోఫాప్ @ 1.25 మి.లీ / లీటరు, వెడల్పాటి ఆకుల కలుపు మొక్కల కోసం ఫెరిథియోబాక్ సోడియం @ 1.25 మి.లీ/లీటరు చొప్పున పిచికారీ చేయాలి. నెలలోని తేమను కోల్పోకుండా ఉండేందుకు తరచుగా అంతర కృషి చేపట్టండి. మొక్కల పెరుగుదల కోసం లీటరు నీటికి 10 గ్రాముల చొప్పున 19:19:19 లేదా 13:00:45 లేదా 20:20:20 ఎరువును పిచికారీ చేయండి. తగినంత వర్షం కురిసిన తర్వాత, ఎకరాకు 25 కిలోల యూరియా మరియు 10 కిలోల MOP (ఫాటాస్) ఎరువులను పైపాటుగా వేయండి. పత్తి పంటలో కలుపు సంహారకాలు మరియు పురుగుమందులను కలిపి పిచికారీ చేయవద్దు. రసం పీల్చే పురుగుల నివారణ కోసం, విత్తిన 30, 45 మరియు 60 రోజుల వద్ద ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా ఫ్లోనికామిడ్ మందును నీటితో 1:20 నిష్పత్తిలో కలిపి కాండంపై పూయండి.													